

## Szécincene (*Parus major*) denevérszákmányolása az Istállóskői-barlangban (Bükk-hegység)

The Bat-Seizing of Great Tit (*Parus major*) in the Istállóskő-Cave (Bükk Mountains)

ESTÓK PÉTER

H-3300 Eger, Rózsa K. u. 8.

**ABSTRACT:** The paper reports on the bat-seizing of Great tit (*Parus major*). Great tits capturing common pipistrelle (*Pipistrellus pipistrellus*) were seen several times during the winter of 1995 in a cave of Bükk Mountains.

1996 január 27.-én azzal a céllal indultunk útnak, hogy egy bizarr információnak járjunk utána. Osztálytársaim 1995 decemberében törpe denevért (*Pipistrellus pipistrellus*) csipkedő szécincenegt (*Parus major*) figyeltek meg az Istállóskői-barlangban.

Mikor a helyszínre érteztünk, két szécincene tartózkodott a barlangban. A mennyezet több, magasan levő repedéséből is törpe denevérek (*Pipistrellus pipistrellus*) és korai denevérek (*Nyctalus noctula*) hangjait hallottuk. A nagy szádájú, nagy részén világos barlang alacsonyabban levő repedéseiben 15 törpe denevért számoltunk meg. Kb. 20 perce tartózkodtunk a barlangban, amikor egy szécincene a barlang belseje felől egy törpe denevért cipelve a barlang szájához repült. Közeledtünkre a szécincene elrepült, a denevért ott hagyta. A bágyadt, álmából felzavart állaton sérülést nem találtam, így visszatettem egy szűk résbe.

Még kb. 30 percig a barlangban maradtunk, eközben három szécincene a barlangban keresgált. Érdekes volt viselkedésük, hiszen a barlang sötétebb részeiben is – ahol a rovarokat már nem vehették észre – kutattak a szűkebb réseknel. S ha egy-egy repedésben megbújó denevér cincogott, hirtelen irányváltoztatással a hang irányába repültek.

A szécincene eddig már sok meglepetést okozott táplálkozásbiológiájával és kiváló alkalmazkodóképességével. Elképzelhető, hogy hasonló barlangoknál, ahol a fent leírt körülmények egyidejűleg megtalálhatók, kemény teleken számítani lehet a szécincenek hasonló viselkedésformájának megjelenésére.